# MANEJO GESTACIONAL NA FÊMEA CANINA

Tudo que você precisa saber para que seu pet tenha uma gestação saudável

## SE LIGA NAS DICAS!

Assim como nós, as fêmeas caninas precisam de alguns cuidados durante a gestação, no momento do parto e no pós-parto para que tudo ocorra da melhor maneira possível.

Fonte: petz.com.br

# QUANTO TEMPO DURA A GESTAÇÃO DA FÊMEA CANINA?

As fêmeas caninas tem seu primeiro cio por volta dos 6 a 8 meses de idade.

Raças maiores tendem a demorar mais para apresentar o primeiro cio.

De maneira geral, a gestação tem uma duração de 56 a 68 dias.

**Quais alterações físicas o tutor pode perceber numa possível gestação?**

Aumento das glândulas mamárias;
Secreção láctea nas mamas;
Alteração no peso e distensão abdominal

## E QUAIS OS CUIDADOS EU PRECISO TER COM A MINHA FÊMEA CANINA QUE JÁ ESTÁ GESTANDO??

# MANEJO NUTRICIONAL

Fonte: casapraticaqualita.com.br

**É necessário o fornecimento de uma ração de qualidade (Premium ou Super Premium)**

Deve ser fornecida uma boa nutrição, em quantidades adequadas, nutritiva e com boa digestibilidade. **Mas por quê?**

Na gestação e na lactação há um aumento da demanda metabólica, isso devido às mudanças fisiológicas na fêmea gestante e às exigências para o crescimento dos fetos. Durante as primeiras 5 a 6 semanas de gestação, o crescimento fetal é mais lento, não sendo necessárias alterações nutricionais nesse período.

Já após o 40º dia da gestação, o tamanho fetal aumenta rapidamente, assim como o peso corporal da fêmea, sendo que nesse período há uma necessidade de aumento gradual na quantidade de alimentação fornecida, além de fornecer esse alimento com maior frequência/número de refeições. Isso é feito para compensar a redução da capacidade estomacal, além de evitar constipação e formação de gases e cólicas intestinais. Nessa fase final, é necessário o fornecimento de alimentos ricos em fontes proteicas (30%), gordura (20%) e com vitaminas e minerais balanceados.

# MANEJO NUTRICIONAL

**E a suplementação com cálcio?**

Exceto em casos de necessidades nutricionais específicas, deve-se evitar a suplementação com cálcio, pois o seu excesso pode alterar a liberação do paratormônio e fazer com que a liberação do cálcio ósseo seja menos efetiva quando necessário, trazendo malefícios.

**Sempre lembrar de fornecer água fresca e a vontade, para manter sua fêmea hidratada!!**

Fonte: a autora, 2023

# EXERCÍCIOS FÍSICOS

**Durante a gestação, posso manter a rotina de exercícios físicos da minha fêmea?**

No primeiro mês de gestação, os exercícios podem ser realizados normalmente!!!

Com o avanço gestacional, é recomendado manter os exercícios porém com diminuição do ritmo e também da frequência das caminhadas, a fim de evitar grandes esforços.

Nas últimas 3 semanas de gestação, o recomendado é que a fêmea fique em repouso!

# VACINAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO

A vacinação é o método mais indicado e seguro para proteger as cadelas de doenças infecciosas transmissíveis!

O ideal é que a cadela gestante já esteja com as vacinas em dia antes do cruzamento ou inseminação, ou com títulos de sorologia com bons níveis de anticorpos.

Evitar a administração de vacinas durante o período gestacional.

As vacinas devem proteger contra doenças, como: cinomose, parvovirose, leptospirose, hepatite infecciosa, raiva, entre outras.

# VACINAÇÃO E VERMIFUGAÇÃO

Já com relação ao controle e endoparasitas e ectoparasitas, é necessária a prevenção ou diminuição da transmissão transplacentária de larvas de *Toxocara canis* e transmissão transplacentária e transmamária de *Ancylostoma caninum*. Para isso, as fêmeas devem ser vermifugadas antes do acasalamento. Se ainda não estiver protegida, pode-se realizar a vermifugação a partir de 45 dias de gestação e 15 dias após o parto, juntamente com os filhotes.

O controle de pulgas e carrapatos também é um cuidado importante!

# ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL

Fonte: Ermolaev Alexanderr

**É importante o acompanhamento de toda gestação com seu médico veterinário de confiança!**

**Como fazer?**

Visitas frequentes na clínica;
Exames físicos periódicos;
Exames de imagem (ultrassonografia e radiografias);
Exames laboratoriais, quando necessário.

**Quando fazer o ultrassom?**

O ultrassom pode ser realizado para diagnosticar a prenhez a partir de 25 dias após último dia de acasalamento, sendo o exame de escolha para avaliar viabilidade fetal.

**Quando fazer a radiografia?**

O raio-x deve ser realizado após os 45 dias de gestação, sendo o exame de escolha para contagem fetal.



Fonte: peritoanimal.com.br

# PREPARAÇÃO PARA O PARTO

Fonte: a autora, 2022

Preparar um ambiente seguro, protegido, quieto e de fácil acesso e higienização. Se preferir, colocar uma caixa ou uma caminha para que a fêmea vá se acostumando e será onde ela vai entrar em trabalho de parto.

Evitar ao máximo o estresse da fêmea gestante.

Colocar fontes de calor para manter os filhotes aquecidos. Além disso, colocar uma caixa forrada para que os filhotes fiquem alojados enquanto a mãe está em trabalho de parto.

Controlar o tempo de parto e nascimento entre filhotes, conforme orientações a seguir.

Observar se a fêmea terá instinto materno e se necessário, auxiliar na limpeza dos filhotes com toalhas limpas e movimentos suaves, além de ligadura e corte do cordão umbilical.

Fonte: blupet.com.br

# PREPARAÇÃO PARA O PARTO

Fonte: a autora, 2023

**O que o tutor deve saber?**

Que o parto tem três fases distintas:

A **1ª fase** que é quando começam a ocorrer as contrações uterinas e o relaxamento da cérvix. Nesse momento, a fêmea ficará inquieta, nervosa, ofegante, com tremores, entre outros sinais, podendo durar de **6 a 12 horas**.

A **2ª fase** é a de expulsão do feto, quando o filhote nasce, durando em média **6 horas**.

A **3ª fase** é a de expulsão das membranas fetais (placenta), podendo intercalar com a 2ª fase.

Ou seja, de maneira geral, é importante saber que o **parto** pode durar desde **6 horas até 48 horas** (dependerá do tamanho da ninhada e outros fatores), mas que o **nascimento entre filhotes** deve ser de **NO MÁXIMO 2 HORAS!!!**

Ou seja, em casos que se observe: contração ineficiente; filhote insinuado no canal vaginal sem progressão; intervalo entre partos muito grande; fêmea canina com desconforto muito grande

**PROCURE AJUDA VETERINÁRIA!!!**

# AGORA VOCÊ JÁ SABE COMO CUIDAR DA SUA GESTANTE!!!



MESTRADO EM CIÊNCIAS VETERINÁRIAS - UNICENTRO
MESTRANDA LARISSA SCHIMANSKI
ORIENTADORA CARLA F. MOYA